

Zeckentest Borreliose



Zecke sofort testen – weil jeder Tag zählt-

Borreliose ist eine durch Zecken übertragbare gefährliche Krankheit für Mensch und Tier. Nur in der **Frühphase einer Infektion bestehen optimale Heilungschancen durch entsprechende Therapien.**

Infektionsrisiko

Die Borreliose wird leider oft noch mit der ebenfalls von Zecken übertragenen Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) verwechselt. Die FSME ist eine Erkrankung, die durch ein Flavivirus hervorgerufen wird. FSME kommt nur in bestimmten Endemiegebieten Mitteleuropas vor und ist nicht flächendeckend verbreitet. In der gesamten Bundesrepublik erkranken jährlich etwa 200-250 Menschen an FSME.

An **Borreliose** erkranken jährlich ca. **50 000 - 100 000 Menschen.**

Gegen FSME ist eine vorbeugende Impfung möglich (Zeckenschutz-Impfung). Eine präventive Impfung gegen Borreliose ist nicht erhältlich.

Die „Zeckenschutzimpfung“ ist KEIN Schutz vor Borreliose!

Folgen der Borreliose-Erkrankung

Die Borreliose kann Gelenkbeschwerden verursachen, das Nervensystem und sogar den Herzmuskel schädigen. Die Heimtücke dieser Krankheit besteht darin, dass die Symptome erst nach Monaten oder Jahren auftreten können. Durch das zu späte Erkennen geht wertvolle Therapiezeit verloren – chronische Beschwerden mit lebenslanger Behandlung können die Folgen sein.

Unterschätzen Sie nicht die Gefahr!

Früherkennung: Nehmen Sie es selbst in die Hand

Bis jetzt war die Diagnose einer Borreliose hauptsächlich über beobachtbare Symptome und langwierige Laboruntersuchungen möglich. Wer nach einem Zeckenbiss sofort Gewissheit haben will, kann jetzt die Zecke auf Erreger **selber untersuchen**. Waren keine Borrelien in der Zecke, ist eine Übertragung nicht möglich. **Trägt die Zecke Borrelien in sich** - das ist bei jeder 3. Zecke der Fall - kann der Betroffene das Testergebnis mit seinem Hausarzt besprechen.

Vorteile des Zeckentests:

Sofortiges Testergebnis vor Ort z.B. im Urlaub, zu Hause oder am Wochenende, ohne lange Wartezeiten beim Arzt oder auf Laborergebnisse.
Eine notwendige Therapie kann sofort eingeleitet werden und verspricht in der Frühphase der Infektion gute Heilungschancen.

Der kinderleichte Zeckentest weist mit 98% Sicherheit Borreliose-Erreger in der Zecke nach. Das Testergebnis liegt innerhalb von 10 Minuten vor. Der Test ist 18 Monate haltbar und sollte in jeder Hausapotheke oder im Erste-Hilfe-Koffer zu finden sein.

- Erhältlich in Apotheken -